1918 — N° 2

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda
in minimis.

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, VIe

1918

Le Bulletin paraît deux fois par mois.

Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les **membres** de la Société, le deuxième, pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales *de la Société entomologique de France*, années 1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à 1895. . . . . 12 et 15 fr.
Annales (années 1896 à 1917). . . . . 25 et 30 fr.
Tables *des Annales* (**1832-1860**), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.
Tables *des Annales, de* **1861** *à* **1880**, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.
Tables *des Annales, de* **1881** *à* **1890**, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.
Bulletin *de la Société entomologique de France* (publication distincte des *Annales*, depuis 1896), années 1896 à 1917, chaque année . . . . . 18 fr.
Bulletin (numéros isolés), chaque. . . . . 1 et 1 fr.
Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N^os^). 5 et 5 fr.
L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.
L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement *par volume* (port compris). . . . . 10 et 12 fr.
Faune *des Coléoptères du bassin de la Seine*, par L. Bedel :
Vol. I (*Carnivora, Palpicornia*) . . . . . (*Épuisé*).
Vol. II (*Staphylinoidea*, 1re part.) (par J. Ste-Claire Deville). . . . . 3 et 4 fr.
Vol. IV, 1er fascicule (*Scarabaeidae*) . . . . . 4 et 5 fr.
Vol. V (*Phytophaga*). . . . . 8 et 10 fr.
1er fascicule seul. . . . . 3 et 4 fr.
2e fascicule seul. . . . . 5 et 6 fr.
Vol. VI (*Rhynchophora*) . . . . . (*Épuisé*)
2e fascicule seul . . . . . 5 et 6 fr.
Catalogue raisonné *des Coléoptères du Nord de l'Afrique*, par L. Bedel, 1er fasc., pp. 1-208, in-8°, 1895-1900. . . . . 10 et 12 fr.
Mémoires entomologiques (*Études sur les Coléoptères*), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr

---

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny. 20 et 25 fr.
Les zoocécidies du Nord de l'Afrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE *L'ABEILLE*

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde, par S. de Marseul, 1889, in-12 . . . . . 3 et 4 fr.
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12. 0 fr. 50
Id. avec Index (*Suppl. au Catalogus*), 1877, in-12. 1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.
Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Méditerranée, par Peyron, 1877, in-12. . . . . 4 et 5 fr.
Mylabrides d'Europe (*Monogr. des*), par S. de Marseul, 1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.; noires : . . . . . 4 et 5 fr.

Silphides (*Précis des genres et espèces des*), par S. DE MARSEUL, 1884, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pselaphides et Scydmenides, par REITTER (trad. E. Leprieur), 1883, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces de l'Ancien Monde, par S. DE MARSEUL :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Oedémerides (*Synopse des*), par GANGLBAUER (traduction de Marseul), 1887, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Ditomides (*Monogr. des*), par P. DE LA BRULERIE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides (*Synopse des*), par E. LEFÈVRE (Appendice par DE MARSEUL), 1876, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. DE MARSEUL, 98 p., 1864, in-12. . . . . 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par DESBROCHERS DES LOGES, 1870, in-12. . . . . 1 50 et 2 fr.

Nanophyes (*Monogr. du genre*), par H. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1869, in-12. . . . . 1 50 et 2 fr.

Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (*Revision des*), *d'après les travaux de M. E. Reitter*, 1889, in-12. . . 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus (*Monogr. du genre*), par HAROLD (traduction A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12. . . . . 0 fr. 50

Oxyporus (*Tableau synopt. du genre*), par A. FAUVEL, 1864, in-12. . . . . 0 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde (*Monogr. des*), par S. DE MARSEUL, 120 p., 1877, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Trichopterygiens (*Synopse des espèces de*), par MATTHEWS, 75 p., 1878, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Apionides (*Monographie des*), par WENCKER, 162 p., 1864, in-12 . . . . . 4 et 5 fr.

Téléphorides (*Monographie des*), par S. DE MARSEUL, 108 p., 1864, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux Stenosis, par ED. REITTER, in-12, 50 p. (Extr. Gazette ent. Allem., XXX, 1866). . . . . 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. SIGNORET, in-8°, 3 p., 1 pl. col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture]

AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Les 2e et 3e trimestres des *Annales* de 1917 ont paru le 8 février 1918.

Le Trésorier rappelle que les *Annales* ne seront envoyées qu'aux membres de la Société qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VIIe, et à toutes les séances de la Société, 28, rue Serpente.

Tous les envois d'argent faits à la Société (par lettres chargées, mandats-poste ou chèques payables à Paris) *doivent être libellés au nom de* **M. Ch. Lahaussois**, Trésorier, et non autrement, pour éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La Planche, Paris, VIIe, soit au siège de la Société, 28, rue Serpente.

L'Abeille. — Le 4e fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

M. **G. Melou**, 26, rue du Fort-Melville, à Diégo-Suarez (Madagascar) serait heureux d'entrer en relation avec entomologistes pour la détermination d'Insectes malgaches de tous les ordres (sauf les Lépidoptères) ; échangerait Insectes de tous les groupes contre bon vérascope Richard et plaques, microscope, livres récents d'entomologie, ornithologie, conchyliologie ou autres ouvrages scientifiques intéressants, ou revues littéraires illustrées. — Base d'appréciation : 0 fr. 50 l'exemplaire.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

Mlle C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (Ve).

Envoi du tarif sur demande.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 23 janvier 1918.

Présidence de M. le Dr P. MARCHAL.

M. L. CAPITAINE, récemment admis, et M. L. DUPONT (d'Évreux) assistent à la séance.

Correspondance. — M. L. FAGE, récemment admis, et M. A. MANCIER, membre assistant, remercient la Société de leur admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de bonnes nouvelles de MM. le Dr M. BOITEL, actuellement à Rabat (Maroc occidental), et le Dr Maurice ROYER, récemment promu médecin-major de 2e classe.

Nous avons eu le plaisir de voir, à son passage à Paris, M. le Dr R. JEANNEL.

Nécrologie. — La Société a appris avec regret la mort de l'un de ses doyens, M. Gustave-Adolphe BAER, décédé à Paris, le 13 janvier 1918, à l'âge de 79 ans.

G. BAER, originaire d'Aarau (Suisse), était entré à la Société en 1859. Il quitta Paris en 1867 pour s'installer à Manille (Philippines) où il demeura jusqu'en 1882. De retour à Paris, il remplit pendant dix ans, et avec un dévouement dont la Société n'a pas perdu le souvenir, les fonctions ingrates de Secrétaire adjoint (1886-1896). Il partait ensuite au Pérou, y séjourna jusqu'en 1898, puis fit, en 1900, la traversée des Andes. Son dernier voyage fut une expédition en 1905 dans la province de Goyaz (Brésil), expédition particulièrement pénible et dont il a donné le récit dans le *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, [1907], p. 288.

A son retour de Manille, G. Baer avait publié dans nos *Annales*, [1886], pp. 97-200, un « Catalogue des Coléoptères des îles Philippines » aussi parfait qu'il pouvait l'être à cette époque.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que M. le Dr A. Clerc vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Commission du Prix Dollfus 1917 (Rapport). — Au nom de la Commission du Prix Dollfus, M. C. Pierre donne lecture du rapport suivant :

La Commission du Prix Dollfus s'est réunie le 18 janvier 1918, sous la présidence de M. J. de Joannis (1). Aucun ouvrage n'ayant été présenté, elle a décidé, à l'unanimité, de désigner à vos suffrages l'ensemble des travaux diptérologiques du Dr J. Villeneuve, dont l'œuvre, déjà considérable, est intéressante au plus haut point.

Le Dr Villeneuve a donné, cette année, de nombreuses notes dans notre *Bulletin*. Nous y trouvons : N° 7, Descriptions d'espèces nouvelles de la famille des *Cypselidae*; — N° 13, Un cas tératologique nouveau chez les Tachinaires; — Diptères intéressants pour la Faune française; — N° 15, Note sur le *Tabanus exclusus* Pand.; — N° 17, Descriptions de Muscides nouveaux. — Puis, dans les *Annales* [1917], une savante étude sur les espèces africaines du genre *Thelychaeta* Brauer-Berg.

Qu'il nous soit permis maintenant de citer aussi quelques-uns de ses travaux antérieurs, dont le nombre et la valeur justifient le choix de la Commission. Nous trouvons, depuis longtemps déjà, le nom du Dr Villeneuve dans les périodiques français et étrangers. Passons rapidement en revue les premiers, qui nous intéressent plus particulièrement : Contributions au Catalogue des Diptères de France (*Feuille des J. N.*, [1903-04-06], etc. et Contributions au Catalogue des Diptères de Belgique. Ce ne sont pas de simples listes de noms de genres et d'espèces, mais des notes accompagnées d'observations biologiques et géographiques, avec des tableaux dichotomiques permettant l'analyse de variétés difficiles à déterminer : Variétés de *Merodon equestris* et Espèces et variétés du genre *Sphaerophoria*.

Dans son Coup d'œil sur la Faune diptérologique des Alpes françaises (*Ass. franç. Av. Sc.*, Grenoble 1904), il signale de nombreuses espèces nouvelles pour notre faune et d'autres peu connues ou absolument inédites.

Nous le voyons encore collaborer au *Bulletin de l'Association fran-*

(1) Étaient présents : MM. Alluaud, Bourgoin, L. Demaison, J. de Joannis, Ét. Rabaud et C. Pierre. — Excusés : MM. Berlioz, Dumée et J. de Gaulle.

çaise (Lyon, 1907) avec une Étude sur les Diptères du genre *Sarcophaga*, puis au *Bulletin du Muséum* : Asilides nouveaux de Corse (1911) et Diptères nouveaux du Nord-Africain (1912), etc.

Sans parler des nombreuses descriptions données par le Dr Villeneuve dans le *Bulletin* et les *Annales* de notre Société, nous trouvons, dans les différents périodiques précédemment cités, des notes critiques sur les Bombyles de Meigen au Muséum de Paris (*Bull. Soc. ent. Fr.*, [1903], sur les *types* de Meigen au Muséum de Paris (*Ann. Soc. ent. Fr.*, [1905], et sur les espèces des genres *Asilus* et *Thereva* dans la collection Meigen, à Paris (*l. c.* [1909]).

Ailleurs, il aborde des études d'anomalies : Les Travestis (*Feuille des J. N.* [1912]; puis ce sont de précieuses indications pour les débutants : De l'importance des pièces génitales chez les Diptères (1902) et Chasse et préparation des Diptères (*l. c.*, [1905]), etc.

Dans les publications étrangères, il fait paraître des descriptions et traite des questions de synonymie ou de critique, sous les titres de Notes diptérologiques, — Variations chez les Diptères Tachinaires, — Vieux-neuf diptérologique, — Études, etc. Il nous est impossible de tout énumérer ici, mais nous ne pouvons cependant passer sous silence un mémoire important sur les Myodaires africains, paru dans *Annals of the South African Museum*, XV [1916].

Le Dr Villeneuve s'est spécialisé dans l'étude si difficile des Muscides et particulièrement des Tachinaires, dont la vie est si intimement liée à celle de quantité d'autres Insectes, principalement des Lépidoptères.

Dans tous ces travaux, nous retrouvons les mêmes qualités de netteté, de clarté et de précision, qui témoignent de sa connaissance parfaite de la morphologie et de la systématique.

En présence de cette œuvre de haute valeur, la Commission, à l'unanimité, vous propose de décerner le Prix Dollfus au Dr J. Villeneuve, pour l'ensemble de ses travaux sur les Diptères.

— Le vote pour le prix Dollfus aura lieu à la séance du 27 mars 1918 (1).

(1) Le Secrétaire rappelle que tous les membres français ont droit de prendre part à ce vote, directement ou par correspondance.

Dans ce dernier cas, leur bulletin de vote devra être inclus dans une enveloppe fermée, portant extérieurement leur signature, et elle-même insérée dans une seconde enveloppe à l'adresse du Président de la Société entomologique de France, 28, rue Serpente.

Les votes par correspondance devront parvenir au siège de la Société le 27 mars 1918, à 8 h. du soir au plus tard.

Admission. — M. Anthero-Frederico DE SEABRA, conservateur au Muséum d'Histoire naturelle de Lisbonne (actuellement 23, rue de Jussieu, Paris Ve). — *Entomologie générale et entomologie appliquée.*

Présentation. — M. James W. MUNRO, lieutenant, Royal Army medical Corps, Quick laboratory, New Museums, Cambridge (Angleterre), présenté par M. D. KEILIN. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. ALLUAUD et le Dr ÉT. RABAUD.

Démission. — M. E. CORSY adresse sa démission, pour raisons de santé.

Exonération. — M. Louis FAGE s'est fait inscrire comme membre à vie.

Communications.

Notes sur *Macronota flavofasciata* Moser et sur les espèces voisines
[COL. SCARABAEIDAE]

par A. BOURGOIN.

MOSER (*Berl. entom. Zeitschr.*, XLVI [1901], p. 527) a décrit, sous le nom de *Carolina flavofasciata*, un *Macronota* noir ayant sur les élytres une large fascie transversale jaune; il n'a pas indiqué le sexe des individus examinés par lui.

A la page suivante, il a décrit un *Carolina lurida* recueilli à la même date et dans la même localité que *flavofasciata* (Haut-Tonkin : monts Mauson, avril-mai, FRÜHSTORFER), il n'a pas non plus indiqué le sexe des individus décrits; ceux-ci sont de même forme que *flavofasciata*, n'en différant qu'en ce qu'ils sont entièrement couverts de squamules gris jaunâtre et doivent ressembler aux femelles de *Macronota Oberthüri* Lansb. (*Notes Leyd. Mus.* IX [1887], p. 167) décrites par LANSBERGE comme espèce distincte sous le nom de *Taeniodera humilis* (*l. c.*, p. 166); il est vrai que le dimorphisme sexuel, surtout au point de vue de la coloration, est très accusé chez certaines espèces de *Macronota* et peut expliquer l'erreur commise par LANSBERGE. Dans « Fauna of British India, Col. Lamell., *Ceton.-Dynast.* (1910), p. 52 », ARROW a figuré sous le nom de « *flavofasciata* Moser » une espèce de l'Inde, voisine de celle du Tonkin, et qu'il est impossible de distinguer de *flavofasciata* d'après la description publiée par MOSER. J'ai décrit ultérieurement cette espèce de l'Inde sous le nom de *M. batillifera* (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1914], p. 292.

Auparavant j'avais examiné tous les individus de *M. flavofasciata* de la collection R. Oberthür, tous ceux de *M. batillifera* de la même collection et ceux des collections du British Museum. J'ai constaté qu'ils étaient tous mâles, mais qu'ils avaient tous l'abdomen convexe et pouvaient facilement être pris pour des femelles.

Arrow avait bien reconnu que tous les *M. batillifera* du British Museum étaient des mâles, mais il avait noté la présence d'une femelle dans la collection O. Janson.

J'avais toujours pensé que cette prétendue femelle devait être un mâle de *flavofasciata* provenant du Tonkin. Maintenant, le doute n'est plus possible, O. Janson ayant extrait le forceps de la bête en question qui est bien *flavofasciata* du Tonkin (*Trans. ent. Soc. London* [1917], p. 108).

J'ai reçu de M. Vitalis cinq individus mâles de *flavofasciata* et deux autres *Macronata* répondant exactement à la description de *lurida* Moser; tous ont été capturés à la même date, dans la même localité (Haut-Tonkin : Chapa). Tous les *M. flavofasciata* sont des mâles, et les deux autres, des femelles. *M. lurida* est donc très probablement la femelle de *M. flavofasciata*.

J'ai décrit (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1915] p. 158) sous le nom de *M. lata* des *Macronota* femelles ressemblant aussi aux femelles de *M. Oberthüri*. Je possède maintenant un mâle de même provenance que je n'hésite pas à rapporter à *M. lata* : il a la forme de *M. flavofasciata*, mais il est plus allongé et il a les élytres avec une bordure irrégulière de couleur d'ocre rouge, au lieu d'être traversés par une large bande jaune. C'est certainement le *Carolina flavofasciata* subsp. *formosana* décrit par Moser (*Deutsche Ent. Zeitschr.* [1910], p. 298) en même temps que deux autres sous-espèces de *Macronota* auxquelles il applique également l'épithète de *formosana*.

La femelle de *M. batillifera* n'est pas encore connue, mais il est probable qu'elle ressemble également beaucoup à celle de *M. Oberthüri*.

Si l'on fait abstraction de la couleur et de la forme des taches et lignes squameuses qui existent chez ces divers insectes, on constate que les *M. crucicollis* Lansb., *M. Oberthüri*, *M. flavofasciata*, *M. batillifera* et *M. lata* sont des espèces extrêmement voisines les unes des autres, bien qu'elles aient été généralement rangées dans des sous-genres différents.

Description d'une nouvelle espèce de *Pachylopus* d'Algérie

[Col. Histeridae]

par H. Desbordes.

Pachylopus Chobauti, n. sp. — *Oblongo-ovatus, sat convexus, niger, antennis, pedibus et elytris rufescentibus, supra undique punctatus. Caput planum, sulcis nullis, stria integra valde impressa antice subcarinata. Pronotum ciliatum, stria lateribus et antice integra, basi parum continuata; punctis lateribus fortioribus, medio sparsis et levibus. Elytra punctata, humero excepto; striis punctatis, humerali tenui, subhumerali interna vix notata, disjuncta, externa nulla, dorsalibus duabus primis dimidiatis, quarta minima, cum suturali connexa, hac integra linea punctorum aucta, cum stria apicali juncta. Propygidium et pygidium dense et fortiter punctata, hoc valde convexo. Prosternum constrictum, striis antice approximatis. Mesosternum sparse punctatum, antice fere rectum, stria medio retroangulata, in metasterno lateribus continuata. Metasternum stria sulciformi longitudinali notatum. Tibiae anticae tridentatae, intus ciliatae, intermediae posticaeque valde spinosae.* — Long. 2,75-3 mm. (capite et pygidiis exclusis).

Types : deux exemplaires récoltés par le Dr A. Chobaut à Touggourt (sud du dépt de Constantine) en mai 1898.

Entièrement ponctué en dessus, à l'exception du calus huméral; ponctuation beaucoup plus fine sur la tête. Front séparé de l'épistome par une strie entière, assez enfoncée, mais à peine cariniforme. Pronotum fortement cilié; strie marginale un peu continuée à la base chez un exemplaire, à peine visiblement chez l'autre. Élytres avec une teinte rufescente caractéristique, régions scutellaire et suturale seules un peu plus foncées, presque noires; stries bien marquées à la base, se perdant vers le milieu dans la ponctuation générale, les trois premières chez un exemplaire, les deux premières seulement chez l'autre, la 3e strie chez celui-ci étant beaucoup plus courte; chez l'un et l'autre, la 4e strie est courte et reliée à la strie suturale, qui rejoint au sommet la strie apicale et est séparée de la suture par une fine ligne de points. Prosternum très comprimé, la carène presque coupante vers le sommet, où les stries se réunissent. Mésosternum nullement échancré; sa strie ne suit pas le bord antérieur, mais forme un angle obtus en arrière. Fémurs visiblement, mais plutôt médiocrement renflés. Tibias intermédiaires et postérieurs garnis sur la tranche externe de deux rangs d'épines courtes et serrées, ciliés, comme les antérieurs, sur la tranche interne.

P. Chobauti se distingue de toutes les espèces de *Pachylopus* décrites d'Europe et d'Afrique par le front complètement dépourvu de sillons derrière la strie. Il pourrait rentrer, à raison de ce caractère, dans le genre *Saprinus* (sous-genre *Hypocaccus*), 5e groupe de la classification de Marseul ; mais le renflement des fémurs, l'armature des tibias intermédiaires et postérieurs, la brièveté des tarses et la forme du prosternum me déterminent à placer cette espèce dans le genre *Pachylopus*.

Toutefois je dois faire remarquer que le Catalogue des *Histeridae* de 1910 a groupé sous ce nom générique des espèces extrêmement différentes, tout au moins comme forme générale, de celle (*P. dispar* Er.) sur laquelle Erichson a établi le genre *Pachylopus* et qu'une revision de cette classification paraît s'imposer.

Je dédie l'espèce nouvelle de Touggourt à notre excellent collègue M. le Dr A. Chobaut, qui m'en a communiqué deux individus et a bien voulu m'en abandonner un.

Noms nouveaux pour quatre genres de *Melasidae* [Col.]

par E. Fleutiaux.

1. *Galba* || Guér. 1830 (non *Galba* Schrank 1803) = **Galbites**, nom. nov.
2. *Diomus* || Bonv. 1871 (non *Diomus* Muls. 1851) = **Modius**, nom. nov.
3. *Dicladus* || Bonv. 1872 (non *Dicladus* Rafin. 1815) = **Cladidus**, nom. nov.
4. *Soleniscus* || Bonv. 1875 (non *Soleniscus* Meck et Worth. 1860) = **Cussolenis**, nom. nov.

Notes sur quelques insectes du genre *Phaenops* Lac.

[Col. Buprestidae]

par Maurice Pic.

Une récente communication de L. Bedel (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1917], p. 275) m'a donné l'idée de reviser, grâce à l'étude dichotomique publiée par mon savant collègue, les *Phaenops* épars dans mes diverses collections.

Deux spécimens méritent une mention spéciale :

L'un d'eux figure dans la collection Ravoux (dont j'ai acquis les Sternoxes et quelques autres familles) et provient de Nyons (Drôme). Il présente les principaux caractères attribués par L. Bedel au *P. aerea* Form., c'est-à-dire une forme relativement courte, les élytres nettement hérissés de pubescence, le pronotum à points séparés et arrondis sur le disque et dépourvu d'impression antéscutellaire; il a même, comme l'indique Formanek (1), la ponctuation du ventre plus dense, par places, que chez *P. cyanea* Fabr.

L'autre *Phaenops* est le *type* unique de la var. *viridescens* Pic, que j'ai rapportée au *P. cyanea* et décrite brièvement en 1909 (2).

Je l'ai capturé moi-même en août 1896 à Brigue (Valais), mais je ne me souviens plus dans quelles conditions.

Cet insecte pourrait bien être une forme distincte, intermédiaire entre *P. cyanea* Fabr. et *P. aerea* Form.; son corps relativement étroit et faiblement convexe, ses élytres assez nettement pubescents, marqués chacun d'une grosse fossette humérale subarrondie, flanquée au côté interne d'un sillon transversal faisant saillir le rebord basal, et son pronotum densément ponctué avec quelques petites rides sur le disque, sans impression antéscutellaire distincte, constituent ses caractères principaux.

Nervulations anormales de quelques Diptères Tipuliformes

par C. Pierre.

Je possède un certain nombre de Diptères Tipuliformes (*Limnobiidae, Tipulidae*) présentant des anomalies bien marquées dans le système nervulaire des ailes. J'ai pensé qu'il serait utile de les faire connaître, en accompagnant chaque observation de deux dessins exécutés à la même échelle : N, aile normale; A, aile anormale, pour permettre de comparer plus facilement les deux aspects.

Les premiers cas que j'ai observés portent sur l'absence de nervures fermant la cellule discoïdale chez des espèces communes, non douteuses. On se trouve donc en présence de simples anomalies qui ne peuvent donner lieu à la création d'espèces nouvelles.

La suppression de la cellule discoïdale ne toucherait-elle pas de près à la question de la réduction des ailes?

(1) *Wien. ent. Zeitg*, [1900], p. 168.
(2) *L'Échange*, n° 298, p. 169.

Je présente ensuite un autre cas tout aussi intéressant : celui d'ailes à nervures supplémentaires. L'entomologiste américain NEEDHAM s'est beaucoup occupé de ce genre d'anomalies.

Il a comparé des ailes anormales de Tipules à des ailes de Panorpes, signalant une similitude presque complète entre la nervulation de ces Diptères et celle des Neuroptères.

Voici mes quatre premières observations :

I. *Limnobia nubeculosa* Meig., à cellule discoïdale ouverte, fondue avec la deuxième cellule postérieure. Cette anomalie provient de la disparition de la nervur transverse placée entre M^{1+2} et M^3. Elle se répète pareillement sur l'autre aile. — Observation faite sur une ♀ capturée dans les bois du Val-d'Aulnay (22-6-17). — Ma collection.



II. *Limnobia trivittata* Schum., à cellule discoïdale ouverte, fondue avec les cellules postérieures 2 et 3. La nervure transverse unissant M^{1+2} à M^3, et celle placée entre M^3 et Cu^1, ont disparu. — Observation faite sur une ♀ capturée près de l'étang de Trivaux (7-7-17), ♀ accouplée avec un ♂ présentant une nervulation normale, ainsi que sur d'autres individus ♂ et ♀ trouvés au même endroit. L'anomalie se répète sur les deux ailes. — Ma collection.



III. *Tipula livida* v. d. Wulp, à cellule discoïdale ouverte, fondue avec la troisième cellule postérieure. La nervure transverse unissant le pétiole de M^{1+2} à M^3 n'existe pas. Cette anomalie existe sur les deux ailes. — Observation faite sur une ♀ capturée dans la forêt de Saint-Germain (10-6-17). — Ma collection.



IV. *Tipula maxima* Poda, présentant, sur l'aile droite seulement, les anomalies suivantes :



1° la deuxième cellule postérieure (entre M^1 et M^2) n'est pas appendiculée.

2° M^1 possède sur son milieu, une épine E, qui semble être l'amorce d'une nervure transverse.

3° Une grande nervure transverse supplémentaire dans la cellule basale antérieure. — Observation faite sur un ♂ capturé à Décines (Isère) (22-8-16). — Dans ma collection.

Une nouvelle espèce de *Larentia* [Lep.] (*Larentia alpinata*, n. sp.)

par J. Culot.

Il y a quelques mois, étudiant les *Larentia siterata* Hufn. et *L. miata* L. en vue de mon ouvrage sur les Géomètres d'Europe, mon attention fut attirée par un papillon que j'avais reçu jadis des Hautes-Pyrénées, sous le nom de « *Larentia miata* ».

Il s'agit bien d'une forme appartenant au groupe de *miata* et de *siterata*, avec les palpes longs, formant bec, le fond des ailes supérieures blanchâtre et les dessins gris verdâtre, mais d'une taille sensiblement supérieure à celle de *siterata* et de *miata*.

Cet exemplaire me parut être une espèce inédite, mais comme j'hésite toujours à me prononcer pour l'affirmative dans des questions aussi délicates, j'écrivis ce qui suit dans le texte se référant à la planche 23 (actuellement gravée et coloriée) de l'ouvrage susmentionné : « En ce qui concerne le n° 470, si ce n'est pas une *miata*, j'ignore ce que cela peut être; est-ce une espèce nouvelle? C'est possible, mais je ne possède pas des raisons suffisantes pour l'affirmer. »

Le manuscrit où se trouve insérée cette phrase est actuellement à l'impression. Il est probablement trop tard pour y rien changer, et d'ailleurs je préfère le laisser tel que je l'ai rédigé, il y a plusieurs mois, pour montrer mes hésitations du moment.

Or tout récemment, M. v. Büren, de Berne, eut l'obligeance de me communiquer un *Larentia* capturé dans les Alpes bernoises, vers le col de Susten, à une altitude d'environ 1.800 m. et qu'il regardait comme une aberration de *L. tophaceata*. Au premier coup d'œil je cons-

tatai que non seulement il ne s'agissait pas d'une aberration de *tophaceata*, mais qu'il ne paraissait pas possible de rattacher ce papillon à aucun autre *Larentia*, parmi les grandes espèces alpines de ce genre.

J'en informai de suite M. v. Büren et le priai de bien vouloir m'indiquer le nom qu'il désirait voir attribuer à cette remarquable forme. Après échange de vues entre nous, M. v. Büren se décida pour *alpinata*, nom sous lequel je me proposais de publier cette forme nouvelle.

Jusqu'ici j'avais seulement envisagé un rapprochement possible entre l'exemplaire en question et les grandes espèces alpines du groupe de *tophaceata*, *infidaria* et autres. Ce n'est qu'au moment de procéder à la gravure de ce papillon, travail qui nécessite un examen minutieux de l'insecte à reproduire, que ses caractères morphologiques me furent révélés, et que j'eus souvenance d'avoir précédemment gravé sur pierre une forme analogue; j'eus vite fait de constater qu'en effet l'exemplaire envoyé par M. v. Büren était, sans aucune erreur possible, le ♂ correspondant à la ♀ pyrénéenne dont il a été parlé plus haut.

En présence aujourd'hui de deux exemplaires, l'un ♂, l'autre ♀, le doute ne me paraît plus possible, et je n'hésite pas à voir dans ce couple une espèce inédite; fait d'autant plus curieux que le ♂ a été capturé dans les Alpes suisses et la ♀ dans les Pyrénées françaises, c'est-à-dire dans deux pays qui certes n'ont pas manqué d'explorateurs.

Larentia alpinata, n. sp. — La ♀, venant des H^tes^-Pyrénées, a été sommairement décrite ci-dessus. Le ♂, des Alpes bernoises, est semblable comme taille, comme coupe d'ailes et comme dessins, mais les ailes supérieures, dont le fond est également blanchâtre, ont la bande médiane et l'espace basilaire beaucoup plus foncés, d'un noir verdâtre. Les ailes inférieures sont remarquables : tandis que chez la ♀ elles n'ont qu'une fine ligne coudée, chez le ♂ elles sont pourvues (sur un fond blanchâtre) d'une ligne coudée et d'une extrabasilaire, celle-ci passant à l'extrémité de la cellule; toutes deux sont assez épaisses, presque parallèles et réunies entre elles par une ombre d'un gris noirâtre, plus claire que les lignes, mais formant cependant une bande très apparente, qui donne aux ailes inférieures de cet exemplaire ♂ un aspect aberrant (1).

(1) Comme une description, si détaillée qu'elle soit, serait insuffisante pour faire connaître cette espèce et comme il ne m'est pas possible actuellement d'en donner une figure dans le *Bulletin*, on voudra bien se reporter à celles qui paraîtront prochainement dans mon Iconographie des Géomètres.

Nous ne possédons aucun renseignement sur la date de capture du ♂. Il n'en est heureusement pas de même pour la ♀, dont l'étiquette porte la mention suivante : « Gèdre, H^tes^-Pyrénées, 24.IV ». Mais je ne serais pas étonné que l'espèce éclose en automne et que la ♀ capturée en avril soit un sujet ayant hiverné.

Il me reste à attirer tout particulièrement l'attention de notre excellent collègue M. Rondou, de Gèdre, de qui me vient cette ♀, espérant que des renseignements plus précis compléteront prochainement l'histoire, bien imparfaite, de cette nouvelle espèce française et suisse.

Découverte de *Mamestra Renati* Oberth. dans les Alpes-Maritimes [Lep. Heterocera]

par Ch. Oberthür.

Jusqu'à présent le *Mamestra Renati* Oberth., dont la figure a paru d'abord sous le n° 157 de la pl. 9 dans la XXe livraison des « Études d'Entomologie », puis sous le n° 13 de la pl. 17 dans « Noctuelles et Géomètres d'Europe », par J. Culot, n'était connu que d'après le seul exemplaire ♀ capturé à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales) par mon frère.

Je crois intéressant de signaler que cette très belle espèce de *Mamestra* a été retrouvée dans les Alpes-Maritimes au col de Braus, les 14 et 15 juin, et au Moulinet.

Je possède maintenant cinq exemplaires des deux sexes de *Mamestra Renati*. J'ai pu constater un certain degré de variabilité dans l'accentuation des dessins et des taches des ailes supérieures, en dessus; mais les différences que je constate en comparant les exemplaires, tous parfaitement frais, qui sont devant moi, sont de peu d'importance et il ne peut s'élever aucun doute sur l'identité spécifique du *type* des Pyrénées-Orientales et des spécimens des Alpes-Maritimes.

Noctuélite nouvelle pour la Faune française [Lep. Heterocera]

par Ch. Oberthür.

M. Harold Powell a élevé sur le rosier des chenilles qu'il avait trouvées à Hyères (Var), dans une haie de smilax et de ronces, en mars 1916. Ces chenilles lui étaient totalement inconnues. Elles se

sont transformées en chrysalide et ont donné leur papillon en août 1916, à Rennes. Il n'a pas été difficile de reconnaître l'espèce, qui est *Gracilipalpus Ephialtes* Hübner (*nubilaris* Graslin).

Jusqu'ici *Gracilipalpus Ephialtes* avait été seulement trouvé en Andalousie, en Sardaigne (à Sassari), en Sicile, en Algérie (à Lambèse, en août 1912); mais on ne possédait que des exemplaires pris au vol et bien différents de ceux qui n'ont pas encore volé. Ceux-ci sont d'un brun noir profond, brillant, avec les deux lignes extrabasilaire et coudée, ainsi que la tache réniforme, bien marquées.

Le papillon est d'une fragilité extrême. Les écailles sont très fugaces et il faut les plus grandes précautions pour tuer et étaler *Gracilipalpus Ephialtes* sans le déflorer.

L'espèce ne paraît pas commune dans les lieux qu'elle habite. Je n'ai pu jusqu'ici réunir que vingt-deux exemplaires dans ma collection.

Je crois que personne, avant M. Powell, n'avait observé ce Toxocampide en France. C'est pour la faune de notre pays une intéressante addition. Je pense pouvoir donner quelques détails sur la chenille dans le volume XVI des « Études de Lépidoptérologie comparée » qui est consacré à la faune des Lépidoptères d'Algérie, à laquelle nous continuons à travailler en ce moment.

Bulletin bibliographique.

Alluaud (Ch.) : Les Carabiques de la faune alpine des hautes montagnes de l'Afrique Orientale. (*Ann. Soc. ent. Fr.* [1917], p. 73-116) fig.*

Bourgoin (A.) : Description de trois *Macronota* nouveaux. (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1916], p. 133-137) fig.*

Id. : Description de deux *Gymnetis* nouveaux du Brésil (*l. c.*, p. 198-200).*

Id. : Note rectificative sur *Bombodes Vitalisi* Bourgoin et description d'une nouvelle espèce de *Bombodes* (*l. c.*, p. 254-255).*

Id. : Diagnoses préliminaires de Cétonides nouveaux recueillis par M. R. Vitalis de Salvaza en Indo-Chine (*l. c.*, p. 297-299).*

Id. : Diagnoses préliminaires de Cétonides nouveaux recueillis par M. R. Vitalis de Salvaza en Indo-Chine. 2e Note. (*l. c.*, [1917] p. 68-70).*

Bourgoin (A.) : Descriptions de deux *Trichiini* nouveaux de l'Afrique tropicale (*l. c.*, p. 117-121).*

Id. : Diagnoses préliminaires de Cétonides nouveaux recueillis par M. R. Vitalis de Salvaza en Indo-Chine. 3e Note. (*l. c.*, p. 231-233).*

Buysson (H. du) : Observations diverses (*Misc. Ent.*, XXIV (1917), p. 4-7).*

Champion (G.-C.) : The larva of *Byrrhus pilula* L. (*Ent. Monthly Mag.*, (3) III (1917), p. 269-170) fig.*

Id. : A remarkable new *Scirtes* from Nyasaland (*l. c.*, p. 270-271).*

Id. : On new and little known Lagriidae from tropical America. (*Trans. Ent. Soc. Lond.* (1917), p. 169-267, pl. 22-23).*

Laboissière (V.) : Descriptions d'espèces et variété nouvelles de *Galerucini* africains. (*Bull. Soc. ent. Fr.* (1914), p. 359-362), fig.*

Lizer (C.) : Nouvelle espèce d'Ériophyide. — Nouvelle variété de *Chrysomphalus obscurus*. — Mâle de l'*Icerpa subandina*. (*Physis*, III (1917), p. 241-245 fig.*

Mac Culloch (A.-R.) : The destruction of bird life in Australia. (*Austr. Zool.*, I (1917), p. 75-79).*

Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft (*Mitteilungen*), XIV, 1914-1916. ⊙

Agricultural Gazette of N. S. Wales, XXVIII [1917], 10-11. — Froggath (W.-W.) : A lead-boring beetle (*Xylothrips gibbicollis*); p. 814, fig.

Academy of Natural Sciences of Philadelphia (*Proceedings*), LXIX, 1 [1917]. ⊙

Association française pour l'Avancement des Sciences. (Conférences), 1916-1917. ⊙

Anales de Zoologia Aplicada, II, 1-2 [1915]. — Lahille (F.) : Notas sobre los Argásidos chilenos; p. 5. — Porter (C.-E.) : Notas de Parasitologia : IV. Nuevos insectos utiles y otros conocidos, perjudiciales; p. 12. — Id. : Materiales para la entomologia economica de Chile : IV. Notas sobre los Tisanópteros; p. 17, pl. 11. — Brèthes (J.) : Description d'un Braconidae et d'un Proctotrypidae du Chili; p. 13, fig.

— IV, 1 [1917]. — Brèthes (J.) : Sur quelques diptères de Lima (Pérou); p. 16. — Porter (C.-E.) : La ultima invasión de langosta argentina; p. 19, fig.

Indiana Academy of Science (*Proceedings*), 1915. ⊙

Novitates Zoologicae, XXIV [1917], 3. — Rothschild (Lord) : Notes on *Metanastria digramma* with descriptions of two new subspecies; p. 453. — Id. : On the genera *Melanothrix, Drepanojana, Melanergon, Paracydas, Cotana, Hypercidas, Epicydas* and *Nervicompressa* of the family Eupterotidae, with descriptions of new forms; p. 463, pl. 11-12 (non parues). — Id. : Some new moths of the families Arctiidae and Eupterotidae; p. 475.

Review of Applied Entomology (*The*), V, A et B [1917[, 6-12.

Revista Chilena de Historia Natural, XXI, 1-5 [1917]. — Navás (L.) : Lista de Neuropteros cogidos en el valle de Marga-Marga; p. 38. — Porter (C.-E.) : Bibliografia chilena razonada de miriopodos y onicóforos; p. 52. — Id. : Copepodo nuevo para Chile; p. 89. — Brèthes (J.) : Description d'un Mymaride (Hym.) nouveau du Chili; p. 82, fig. — Silva (C.) : Descripcion de un nuevo *Epinephele* y clave de las species chilenas del género; p. 85, fig. — Herbst (P.) : Nuevas avispas autofilas de Chile; p. 105.

Sociedad Rural Argentina (*Anales*), LI (1917), 5. — Massini (P.-C.) : Método biológico contra los plagas aplicado al *Æceticus platensis*, bicho de canasto; p. 373, pl. v. — Brèthes (J.) : El piojo del pino *Leucaspis pini* Hartig; p. 384, fig. — Barbara (B.) : Valor del Cocobacillus acridiorum d'Hérelle para destruir la langosta; p. 385.

Société d'Histoire naturelle de l'Afrique du Nord (*Bulletin*), VIII [1917], 8-9. — Bergevin (E. de) : Description d'une nouvelle espèce d'*Hysteropterum* (Hem.), de la province de Constantine; p. 203, fig. — Id. : Description d'une nouvelle espèce d'*Hymenogaster* du Maroc; p. 232, fig.

Société entomologique d'Égypte (*Bulletin*), [1917], nos 1 et 2. — Ferrante (G.) : Espèces et variétés; p. 15. — Zaki (M.) : Note on a species of *Ascalaphus*; p. 21. — Gough (L.) : On *Wohlfartia magnifica*, a Sarcophagid parasitising man; p. 23. — Debski (B.) : Sur la femelle de *Nomioides fasciatus* Friese et description des autres *Nomioides* d'Égypte; p. 25. — Innes Bey (W.) : Les Adesmies égyptiennes d'après la classification d'Ernest Allard; p. 51. — Al-

FIERI (A.) : Une liste d'Insectes Coléoptères recueillis par feu Aristide Letourneux en Égypte; p. 69. — CLAINPANAIN (J.) : Notes sur certains Coléoptères xylophages d'Égypte et leur abondance à certaines époques; p. 72.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève (*Mémoires*), XXXVIII, 6. ⊙

Société d'Études scientifiques de l'Aude (*Bulletin*), XXV [1914]. — GAVOY (L.) : A propos des cadavres momifiés de *Chelonia caja* L. observés aux environs de Laure et d'Aiguesvives; p. XLVII. — ID. : Sur le champignon qui attaque les chenilles de *Chelonia caja*; p. L.

South African Museum (*Annals*). — XII, 5 [1917].⊙

— XIV, 3 [1917]. — ARNOLD (G.) : A monograph of the Formicidae of South Africa (Myrmicinae); p. 271-402. — XVII, 2-3, 1917. — TUCKER (R.-W.-E.) : On some South African Avicularidae (Arachn.). Families Migidae, Ctenizidae, Diplothelae, and Dipluridae; p. 79, fig., pl. 9. — ALEXANDER (C.-P.) : The Crane-flies of S. Africa in the S. African Museum (Dipt.); p. 139, pl. 10-14. — JANSE (A.-J.-T.) : Description of an apparently undescribed moth of the family Lymantriadae; p. 185. — ESBEN-PETERSEN (P.) : Two species of Bittacidae (Neur.) from S. Africa; p. 187, fig. — MORLEY (C.) : On some South African Ichneumonidae in the collection of the S. African Museum; p. 191.

U. S. Department of Agriculture (*Bulletin*). — 609. JONES (T.-H.) : The sweet-potato leaf-folder; 12 p., fig.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. CHOPARD.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL.

Crustacés : I, *Phyllopoda*, par E. DADAY DE DEÉS. — II, *Amphipoda*, par E. CHEVREUX.

Arachnides : I, *Opiliones*, par le Dr C.-Fr. ROEWER, avec 1 pl. n. — II, *Ixodidae*, par L.-G. NEUMANN. — III, *Araneae* (1re partie), par L. BERLAND.

Hémiptères : I, *Pentatomidae*, par le Dr R. JEANNEL, avec 4 pl. n. — II, *Naucoridae*, *Belostomidae* et *Nepidae*, par A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : par le Dr R. JEANNEL, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, *Pselaphidae*, par A. RAFFRAY. — II, *Onthophagini*, par H. D'ORBIGNY. — III, *Meloidae*, par M. PIC, avec 1 pl. col. — IV, *Hylophilidae* et *Anthicidae*, par M. PIC, avec 1 pl. n. — V, *Hybosorinae*, etc., par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n. — VI, *Buprestidae*, par Ch. KERREMANS, avec 1 pl. col. — VII, *Lampyridae*, par E. OLIVIER. — VIII, *Hispinae*, par R. GESTRO, avec 1 pl. n. — IX, *Dascillidae*, etc., par M. PIC. — X, *Anthribidae*, par K. JORDAN. — XI, *Histeridae*, par H. DESBORDES. — XII, *Dynastinae*, par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, *Proctotrupidae*, *Cynipidae*, etc., par J.-J. KIEFFER. — II, *Formicidae*, par le Dr F. SANTSCHI, avec 2 pl. n. — III, *Chrysididae* et *Vespidae*, par R. DU BUYSSON. — IV, *Braconidae*, par GY. SZÉPLIGETI.

Diptères : I, *Chironomidae* et *Cecidomyidae*, par J.-J. KIEFFER. — II, *Nematocera*, par F.-W. EDWARDS. — III, *Polyneura*, par P. RIEDEL. — IV, *Anthomyiidae*, par P. STEIN. — V, *Brachycera*, par Th. BECKER, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, *Chenilles des galles*, par F. LE CERF, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, *Dermaptera*, par A. BORELLI, avec 2 pl. n. — II, *Mantidae*, par L. CHOPARD.

Pseudonévroptères : I, *Termitidae*, par V. SJÖSTEDT. — II, *Odonata*, par R. MARTIN, avec 3 pl. n.

Névroptères : *Planipennia*, etc., par L. NAVÁS.

Myriapodes : I, *Chilopoda*, par H. RIBAUT, avec 5 pl. n. — II, *Symphyla*, par H. RIBAUT, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VIRIEUX, avec 2 pl. n.

Vers : *Turbellariés*, *Trématodes* et *Gordiacés*, par P. DE BEAUCHAMP, avec 1 pl. n. — II, *Oligochètes*, par MICHAELSEN, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le Dr J. PELLEGRIN, avec 1 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon LHOMME, 3, rue Corneille, Paris (VIe).

Librairie de la Société entomologique de France (*suite*).

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par F. Walker. London, 1869, in-8°. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe, in-8°, Moulins. (Extr. Rev. sc. Bourb.) :

I. *Nécrophages*, traduit de Reitter [par M.-J. Belon], 1890. . . . . 1 fr.

II. *Colydiides, Rhysodides, Trogositides* (traduit de Reitter), 1891. . . . . 0 fr. 50

Histérides nouveaux (*Description d'*), par S. de Marseul, in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.). . . . . 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de Bonvouloir, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 planches gravées. . . . . 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Ragonot, in-8°, 276 p., 4 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1890). . . . . 10 et 12 fr.

Le même, pl. noires. . . . . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae *et* Galleriidae, par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1888). . . . . 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlepidoptères et description d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ragonot, in-8°, 66 p., 1 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1894). . . . . 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch. Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr. Ann. Soc. ent.Fr. 1895). . . . . 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p . . . . . 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p. . . . . 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in-4°, 52 p. (Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n. d. 5 et 6 fr.

Genera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray, in-8°, 621 p., 3 pl. (Extr. des *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1903). 20 et 25 fr.

Pour les *Membres* de la Société, les offres d'échanges, demandes de communications ou de renseignements d'ordre *purement scientifique*, qui n'excéderont pas *cinq* lignes, seront insérées *gratuitement* dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas *dix* lignes, elles coûteront 0 fr. 20 la ligne pour deux numéros.

La Société entomologique de France tient ses séances les 2e et 4e mercredis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, *rue Serpente*.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par an avec planches et figures);

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient une cotisation annuelle de. . . . . 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. . . . . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans) qui paient une cotisation annuelle de. . . . . 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie. Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit *franco* les *Annales*, le *Bulletin*, et, *à titre de prime gratuite*, une série de dix volumes des *Annales* parmi ceux à *prix réduit* restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les *mardis*, *jeudis* et *samedis*, de 3 heures à 6 heures 1/2; le *mercredi, de 8 à 10 heures 1/2 du soir*.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

***L'ABEILLE**, Journal d'Entomologie*, fondé par S. de Marseul, continué par la Société entomologique de France, publie spécialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, *20, rue de l'Odéon*, est chargé de la publication du Journal (*examen et admission des mémoires et correspondance scientifique*).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. *par volume*) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de la Société entomologique, *28, rue Serpente*.

COLLECTIONS

Collection H. Sénac (*Tenebrionidae paléarctiques*),
Collection Ch. Brisout de Barneville (*Coléoptères paléarctiques*),
Collection Vauloger (*Anthicidae, Malachiidae, Erodiidae*),
chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff (*Microlépidoptères*),
Collection H. Brisout de Barneville (*Coléoptères d'Europe*),
Collection Aubé (*Coléoptères paléarctiques*),
Collection Capiomont (*Hyperidae, Lixus, Larinus*),
Collection Vauloger (*Helopidae*).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé (*Diptères de France*),
Collection de Diptères de France, don de M. le Dr Gobert,
Collection A. Cheux (*Lépidoptères de France*),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires *typiques*,
au Siège social, 28, rue Serpente

SOMMAIRE DU N° 2

Séance du 23 janvier 1918

Correspondance. — Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nécrologie. — Distinction honorifique. 53
Commission du prix Dollfus 1917 (Rapport). 54
Admission. — Présentation. — Démission. — Exonération. . 56

COMMUNICATIONS

A. BOURGOIN. — Notes sur *Macronota flavofasciata* Moser et sur les espèces voisines [COL. SCARABAEIDAE]. 56
H. DESBORDES. — Description d'une nouvelle espèce de *Pachylopus* d'Algérie [COL. HISTERIDAE]. 58
E. FLEUTIAUX. — Noms nouveaux pour quatre genres de *Melasidae* [COL.]. 59
M. PIC. — Notes sur quelques insectes du genre *Phaenops* Lac. [COL. BUPRESTIDAE]. 59
C. PIERRE. — Nervulations anormales de Diptères Tipuliformes. — Fig. 60
J. CULOT. — Une nouvelle espèce de *Larentia* [LEP.] (*Larentia alpinata*, n. sp.). 62
CH. OBERTHÜR. — Découverte de *Mamestra Renati* Ob. dans les Alpes-Maritimes [LEP. HETEROCERA]. 64
ID. — Noctuélite nouvelle pour la Faune française [LEP. HETEROCERA]. 64
Bulletin bibliographique. 65

Pour la *correspondance scientifique*, les *réclamations* et les *annonces* s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6e.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET Cie. — PARIS.